



## GROUPE 4 - PETITS APHYOSEMION

Les poissons africains non annuels du genre *Aphyosemion* sont les killies les plus connus, les plus répandus dans les élevages et les plus appréciés. Ceci pour trois raisons principales : leurs très vives couleurs, leur taille réduite et leur caractère pacifique. Pour les concours, le genre *Aphyosemion*, comportant un grand nombre d'espèces, a été divisé en deux groupes, "Petits *Aphyosemion*" et "Autres *Aphyosemion*", en se référant sur le classement en divers sous-genres de ces poissons.

Les *Aphyosemion* du groupe 4 appartiennent ainsi aux sous-genres ***Diapteron*, *Episemion*, *Iconisemion* et *Kathetys***. Ce groupe regroupe certaines des plus petites espèces, dont la taille excède rarement 5 cm de longueur totale, et qui sont aussi parmi les plus colorées et les plus convoitées. Dans ce groupe se trouvent certains des *Aphyosemion* les plus accessibles aux débutants comme *Aphyosemion striatum* ou *Aphyosemion gabunense*. Mais beaucoup d'autres, en particulier les *Diapteron*, ne sont pas parmi les plus faciles à élever, même par des killiphiles expérimentés, qui ne les reproduisent qu'en très faible quantité. Il est donc difficile de généraliser sur les conditions d'élevage de ces poissons et la facilité des diverses espèces. Un exemple de cette difficulté tient à leur région d'origine: certains vivent dans des savanes très chaudes et sont très tolérants en matière de température, tandis que d'autres vivent dans des petits ruisseaux courants forestiers et/ou d'altitude où la température de l'eau avoisine les 20°C seulement, et ces derniers tolèrent mal, voire pas du tout, une montée en température à un niveau qui peut pourtant paraître réduit, de l'ordre de 25-26°C. Tous les "petits *Aphyosemion*" proviennent d'Afrique de l'Ouest et centrale, du Cameroun au Congo Brazzaville, le Gabon étant le pays hébergeant le plus grand nombre d'espèces. Les œufs des "petits *Aphyosemion*" ont, pour la plupart des espèces, une durée d'incubation courte allant de douze à quinze jours. Ce ne sont pas de grands pollueurs donc la filtration peut-être facultative.

**Comportement :** Très peu d'agressivité des mâles envers les femelles

**Alimentation :** Vivants (vers de vase - larves de moustiques - daphnies - vers grindals et enchytrées), nourriture sèche, nourriture congelée (vers de vase - artémias - daphnies). La nourriture, surtout sèche ou congelée, doit être distribuée avec parcimonie afin d'éviter la décomposition nocive des excédents non consommés. La nourriture sèche ou congelée n'est cependant spontanément acceptée que par les poissons qui y ont été habitués dès leur jeune âge.

**"Afin de préserver la vie sauvage, l'animal dont vous venez de faire l'acquisition ne doit pas être relâché dans le milieu naturel."**