



GROUPE 6 - AUTRES APHYOSEMION

Les "autres *Aphyosemion*" du groupe 6 sont tous ceux qui n'ont pas été classés dans les groupes 4 ou 5. Ils appartiennent aux sous-genres *Aphyosemion*, *Mesoaphyosemion* et *Raddaella* et sont dans l'ensemble d'une taille un peu plus importante que les petits *Aphyosemion*, mais souvent de peu, la plupart des espèces restant d'une longueur totale voisine ou inférieure à 6 cm.

Dans ce groupe figurent les *Aphyosemion* au sens strict, qui sont ceux appartenant au groupe *elegans*, et qui sont tous des poissons originaires de l'immense bassin hydrographique du fleuve Congo, au cœur de l'Afrique centrale. Dans l'ensemble, on peut considérer les *Aphyosemion* de ce groupe plus délicats à reproduire que la plupart de ceux des groupes 4 et surtout 5. C'est souvent en utilisant la méthode dite "naturelle" que la reproduction se réalise le mieux. Il s'agit simplement de laisser faire la nature dans un aquarium bien encombré de végétation, où un couple de reproducteurs est maintenu: au bout d'un certain temps, des alevins apparaissent naturellement et se développent avec les parents. La difficulté d'élevage de beaucoup d'espèces est encore principalement due au fait qu'elles ne supportent pas les températures élevées, 25° C seulement étant déjà pour certaines une température extrême. Les œufs de certaines espèces sont aussi plutôt petits et fragiles.

Ce ne sont pas de grands pollueurs donc la filtration peut-être facultative.

Comportement : Très peu d'agressivité des mâles envers les femelles

Alimentation : Vivants (vers de vase - larves de moustiques - daphnies - vers grindals et enchytrées), nourriture sèche, nourriture congelée (vers de vase - artémias - daphnies). La nourriture, surtout sèche ou congelée, doit être distribuée avec parcimonie afin d'éviter la décomposition nocive des excédents non consommés. La nourriture sèche ou congelée n'est cependant spontanément acceptée que par les poissons qui y ont été habitués dès leur jeune âge.